幸福報

鈕儀署

第一八七期
（民國十九年二月念一日）
每份售洋二分
館址上海三馬路雲南路口

定報價目
每三日出一張五個月一元全年二元寄費在內本外埠一律國外加倍郵票代現九五計算

廣告價目
每期每格（共計五方寸）五元均排於新聞之旁如欲入新聞中長期面議

本期要目

女子不注重衛生之害
中風芻言
小藥囊
論吐血衄血之原因及治法
陰陽易病之原因
步石丹仁兄病（原韻）
近代名人之醫藥評論

吐血與肺癆

醫士楊志一著

未病者讀之　可知預防之法
已病者讀之　可謀挽救之策
疑似者讀之　可以渙然冰釋
醫學家讀之　可知治療正軌

故本書出版以來。風行遐邇。以其書中語語精切。有益實用也。
□每册實洋兩角
□郵票代現通用
上海三馬路雲南路幸福報館發行

△女子不注重衛生之害　牛峻齋

(一)束胸……礙乳房之發育
(二)時裝……招風邪之易入
(三)敷粉……阻皮膚之排泄

文明愈進。病變彌繁。窈窕淑女。每罹不測之疾。嬿美芳顏。易感病魔之災。嬌姿妙齡。即現弱態。荳蔻青年。嘗有黃瘦。伉儷情濃。每起半途折弦之悲。姊妹愛篤。不免互相間疾之勞。少婦因感暴疾。動致不救。老嫗沾染宿病。累纏終身。由是以觀。幾乎疾苦皆賦閨閣。天災竟與坤道。此無他。無非不講衛生之故也。我國舊日之纏足積弊。摧殘天然之筋骨。已屬不合。社會現時之束胸陋習。阻礙乳房之發育。尤屬難堪。加以所服時裝。招風邪之易入。所敷香粉。阻皮膚之排泄。何一而非致病之行，况當發育時期。不戒強烈之刺激。過度之運動。則意外之精神病。與夫生殖器病。因之而生。迨至月事時下。肉慾妄縱。激經痛苦。濁帶纏綿。始則惡疾諱醫。終則釀成大患。比比然也。且女性以血為主。潮期也。胎前也。產後也。貪半點口腹。惡魔乘隙以入臟。欠一分謹慎。毒菌趁機以臨身。縱知衛生。因生計之關係。每操勞之過度。以致或小產。或子宮變位。或神經鬱結。內傷外感。紛紛病魔。種種痛苦。詎非不注重衛生。有以自貽伊戚耶。

本報主筆

朱振聲醫士
楊志一醫士

診例

(甲)特號二元　隨到隨診
(乙)門診一元　貧病減半
(丙)出診四元　路遠遞加
(丁)膏丸方四元　次日取件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後
診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家
電話六三四九三

掛號處啟

本館代售各種靈驗藥品

丹方一味。氣煞名醫。我中醫治病之奇劾。殊出人意料之外。每有數年沉痾。見效一旦。纏綿之症。愈於霍然。本館有鑒于此。是以有代售各地靈藥之發起。凡各症之讀者。如有的確經驗之方。而會經試驗有效者。製為丸藥。本館願代為推銷。大開病家方便之門。謀進人羣幸福之途。此本館發起斯舉之徵旨也。

最新白濁丸

□主治　本丸純用中藥精製而成凡白濁新起淋漓不爽溺管刺痛者服之大有利濁止痛之功絕無流弊
□服法　每盒分四次服早晚空腹時用開水吞下服盡二盒自見功效
□禁忌　服丸後禁忌烟酒及一切辛熱品又老白濁溺管不痛者忌用
□價目　每盒大洋一元　每打大洋十元

杭州　李惠民監製

咳嗽粉

主治　專治一切新久咳嗽神效無比
服法　每袋分三次服每日食後開水調服或加冰糖少許尤佳
價目　每袋大洋三角　每打大洋三元
代售處　上海幸福報館

上海張步波監製

□近代名人之醫藥評論

（浙江大學教授顧惕生）

□中醫科學化之商兌（一）

▲西醫所謂科學化乃打官話
▲中醫所謂科學化乃做時髦

今日有最流行之用語曰科學。而中醫亦受此用語之打擊。回憶本年之業西醫者。對於中醫之恨視。幾欲滅此而朝食。故春間衛生會開會之提案。雖吾人善忘者。當猶尚赫然湧現於腦際。真可云醫恥等於國恥而永不能忘也。徒以中醫反抗之強烈。挾全國輿論之否認。為最有力之後盾。而業西醫者不得不稍殺其兇燄。不然。中醫殆矣。於是經此劇烈奮鬥之結果。而得一暫時休戰之宣告。曰「中醫當科學化」。此言也。當分兩面而觀之。

(甲)業西醫者或偏袒西醫者正欲絕滅中醫。無如時機未到。醫之巴蛇吞象。一時不能下咽。即暫吐之而飾為其辭曰「中醫當科學化」。此乃放棄其急進之手段。而用緩慢征服中醫之策畫。可謂為「打官話」者矣。

(乙)業中醫者或愛護中醫者誠恐中醫絕滅。不如趁早投降。醫之與為學否。幾度受人譏弄。則憤智之而效為其辭曰「中醫當科學化」。此乃自與其獨立之資格。而偏走入盲從西醫之途徑。可謂為「做時髦」者矣。

是故由甲乙兩面而論。皆於中醫有百害而無一利。須知真正之中醫。打不得半句官話。做不得一點時髦。是於中醫自己之人格。於對方病者之生命。皆有莫大之關係。爰不揣所見之精昧。而敢貢愚者之一得。以與當世宏達君子。共商榷焉。

法儒孔德 Comte 之言曰「人類智識之進步。由神學而進於哲學。（未完）

△中風芻言（一）

宮際園

自來談醫者。傷寒而外。莫不首究中風。誠以為百病之長。研究不可不精。石頑謂其分經絡。定臟腑。與傷寒無異。非精達南陽至理。難以語此。蓋重之也。論中風之最精者。莫內經金匱若。而諸家亦多所發明。了無剩義。又何待余之研拇枝指為也。第其所發明者。為論症用藥。而於致病之原則略焉。予所欲言者。在究其原耳。實非騖于新談。以相矜異。區區此心。竊欲援引西說。證明經旨。求其溝通。勉識標榜。俾中西醫家。俱能了澈。是則予之志也。知我罪我。其在讀者乎。下所論列。謹就中西學說可以互通者述之。而更加論斷焉。

帝曰。其有卒然暴死暴疾者。何也。少師曰。三虛者。其死暴疾也。得三實者。邪不能傷人也。帝曰。願問三虛。曰。乘年之衰。逢月之空。失時之和。因為賊風所傷。是謂之虛。故論不知三虛。工反為粗。帝曰。願問三實。少師曰。逢年之盛。遇月之滿。得時之和。雖有賊風邪氣，不能危之。

邪之中於人也無有常。中於陰則溜於府。中於陽則溜於經。

風中五藏六府之俞。亦為藏府之風。各入其門戶所中。則為偏風。故風者百病之長也。

偏枯痿厥。肥貴人膏粱之疾也。

內奪而厥。則為瘖痱。

虛邪客于身半。其入深。營衛衰則眞氣去。邪氣內留。發為偏枯。

寸口脈浮而緊。緊則為寒。浮則為虛。虛邪相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。（未完）

小藥囊

歡迎投稿

喉科良方（續）（戴橘園）

綠獅丹。治咽喉口舌風火症。煅中白二錢。煅龍骨一錢。西瓜霜三錢。元明粉三錢。月石三錢。黃連三分。晚蠶繭（出蛾者入明凡煅枯七個）。孩兒茶三錢。黃柏三錢。雄黃二錢。飛青代三錢。冰片四分。共末貯細瓶收聽吹。

黃獅丹。治咽喉口舌諸症。明雄二錢。生黃一錢。黃連三錢。黃柏三錢。西瓜霜三錢。冰片二分。共末吹。

白獅丹。治咽喉等症。明礬一錢。火硝三錢。月石三錢。各研為末。以銀罐於炭火上。先入明礬一層。入火硝一層。又入明礬一層。入月石一層。再入明礬一層。如此入完。煅如饅首。冷定取出。加生蒲黃一錢。甘草一錢。姜蠶五分。炙雞金五分。薄荷葉二錢。炙猪牙皂五分。冰片五分。共研細末。瓶收吹之。

黑獅丹。治咽喉火盛壅腫。痰涎凶惡險症。鹽皂角。綠錦。殭草。竹二青。右藥。用烏梅煎水。和童便浸一宿。取出燒灰。存性。研末。加枯礬等分。冰片一分。牛黃二分。共研細末。瓶收吹之。

蜘蛛礬散。治一切喉症。有起死回生之功。明礬一兩。入杓化開蜘蛛一個。小者二三個。同煅枯。加冰片一分。末吹。

劉君鑒　稿擠大作容後發表

論吐血衄血之原因及治法（三）

張錫純

繼又有濟南金姓少年。寓居奉天。其人素強壯。驟得吐血證。其脈左右皆有力。遂變通右用之方。用生赭石細末六錢。與大黃肉桂細末各一錢和勻。開水送服。其病立愈。後因用此方屢次見效。遂將此方登於三期衷中參西錄。名之為秘紅丹。

又治滄州城東路莊子馬氏婦。欬血三年不愈。即延治治愈。旋又反覆。後愚診視。其夜間多汗。遂先用生龍骨生牡蠣淨萸肉各一兩。以止其汗。連服兩劑。汗止而欬血亦愈。自此永不反覆。繼有表弟張印權。出外新歸。言患吐血證。初則旬日或浹晨。吐血數口。浸至每日必吐。屢治無效。其脈近和平。微有芤象。亦治以此方。三劑全愈。後將此方傳於同邑醫友趙景山。張康亭皆以之治愈欬血吐血之久不愈者。後又將其方煎湯。送服三七細末二錢。則奏效尤捷。因名其方為補絡補管湯。登於三七吐衄門中。蓋欬血者多因肺中絡破。吐血者多因胃中血管破。其破裂之處。若久不愈。欬血吐血之證。亦必不愈。龍骨牡蠣萸肉。皆善斂補其破裂之處。三七又善化瘀生新。使其破裂之處速愈。是以愈後不再反覆也。若服藥後血仍不止者。可加生赭石細末同煎服。又治舊滄州北關趙姓。年過四旬。患吐血證。其證從前治愈。屢次反覆。已歷三年。有一年重於一年之勢。其脈濡而遲。息氣虛弱。常覺息氣不能上達。且少腹間時覺有氣下墜。此胸中宗氣（亦名大氣）下陷也。內經謂宗氣積於胸中。以貫心脈。而行呼吸。是宗氣不但能統攝氣分。並能主宰血分。因其下陷。則血分失其統攝。所以妄行也。遂投以拙擬升陷湯。（方在三期第四卷係生箭六錢知母四錢桔梗柴胡各錢半升麻一錢）加生龍骨牡蠣各六錢。服兩劑後。氣息即順。少腹亦不下墜。遂將升麻減去。加生懷山藥一兩。又服數劑。其吐血證自此除根。按吐血證最忌黃芪升柴桔梗諸藥。恐其能助氣上升血亦隨之上升也。因確知病係宗氣下陷。是以敢放膽用之。然必佐以龍骨牡蠣。以固血之本源。始無血隨氣升之虞也。吐衄之證。因宗氣下陷者極少。愚臨證四十餘年。僅遇趙姓一人。再四斟酌。投以升陷湯加龍骨牡蠣治愈。自此方實不可輕試也。言近在津沽。有南門外張姓。年過三旬。患吐血證。醫者為中。有柴胡二錢。服後遂大吐不止。倉猝迎愚診視。其脈弦長有力。心中發熱。知係胃氣因熱不降也。所携藥囊中。有生赭石細末一兩。俾急用水送服強半。候約二十八分鐘。覺心中和平。又送服其餘。其血頓止。繼用平胃寒降湯調之全愈。是知同一吐血證也。有時用柴胡而愈。有時用柴胡幾至誤人性命。審證時可不細心哉。至於婦女倒經之證。每至行經之期。其血不下行而上逆作吐衄者。宜治以四物湯。去川芎。加懷牛膝生赭石細末。

中醫朱振聲著

婦女病

解婦疾痛指婦健途
決女病苦導女康徑

本書內有各種治法

簡明辨症法　心理治療法　實驗退斑法　根本美容法　肝氣自療法　血崩急救法　久帶靈效法　不藥治病法

求孕得胎法　辨別胎孕法　臨產預知法　暗產避免法　通乳神效法　難產催生法　產後袪瘀法　避孕簡便法

經漏自療法　痛經立止法　經水辨色法　乾血癆治法　經閉通經法　立下胞衣法　產門退腫法　產後救暈法

橫生急救法　難產急救法　坐臀產治法　背包生治法　偏產急救法　盤腸產治法　陰腫生治法　陰癢治療法

全書洋裝一大厚冊　特價紙收大洋四角

上海三馬路雲南路幸福報館發行

陰陽易病之原因及療法（李健頤）

熱病傷寒之人。脈絡中皆有毒菌潛伏。雖經服藥殺除。而至病愈。然其身體之餘毒。尚未乾淨。苟或不慎。禍即旋踵。顧為禍之甚者。其惟淫慾乎。淫慾之害。不特病者自受其禍即不病之人。與病者交媾。亦能直接承受病人之餘毒。以發種種之病症。此病即所謂陰陽易病也。傷寒論云。「陰陽易之謂病。其人身體重。少氣。少腹裏急。小便不利。陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒裩散主之」。夫熱毒伏於腎臟。封蟄堅固最難搜出。必待諸邪俱離。而腎中之毒。方獲漸漸脫除。病後餘毒未離。伏埋腎中。外受淫慾之刺激。毒火全歸於精室。或婦人之卵巢。稠蟲卵珠。皆傳毒菌。潛存不發。再加淫慾之激。受交媾為引線。男感其氣。女受其毒。兼以不病者。腎陰本虛。受氣之後。遂發成病。按此病屬之於腎。腎居下焦。故身體重。少氣。少腹裏急。小便不利。陰中拘攣。毒中有熱。熱氣上衝。胸主衝任。衝任通於腎。熱氣循經脈至於胸。頭之腦。主屬腎。眼之筋。播於腦。腎中有毒。累及頭部眼筋。故頭重不舉。眼中生花也。仲景先師治以燒裩散。即取婦人中裩近隱處者。剪燒灰。和開水服。（未完）

步石丹仁兄病起原韻（無言）

盟兄石丹。成病起一律。偶憶九月間。予亦患此。同病相憐。爰步原韻。以博石哥一笑

病魔底事苦相欺。君病如余強自持。（九月間予亦患濕病）。誰似扁盧能濟世。（作濟世之扁盧）。古今有幾）。耐落酸苦嘗甘飴。（耐落酸苦已多）。豈獨藥水）。炎涼嘗盡人情態。（歷盡世態炎涼）。病中寒熱無常。何足為懼）。倘根偏多瘦弱詩。（病後瘦弱。作詩嘗亦如之）。累我枯腸搜索破。還將我病信君醫。

十九，一，卅日於吳江